

Правильная дезинфекция рук в течение 30 секунд

Втирать в кожу кисти
рук горсть (3-5 мл)
дезинфекционного средства
до его полного высыхания.

Особенно важно:
кончики пальцев,
внутренняя поверхность
рук и пространство между
пальцами.



MRE-Netz Rhein-Main e.V. Сеть наблюдения за мультирезистентными возбудителями региона Рейн-Майн - это объединение отделов здравоохранения местных администраций, больниц и других участников системы здравоохранения в регионе Рейн-Майн

Дальнейшую информацию можно получить:

- от нашего больничного персонала
- по телефону **069-212-4 88 84**
MRE – Netz Rhein-Main –
- по e-mail mre-rhein-main@stadt-frankfurt.de
- в интернете на www.mre-rhein-main.de

Информация для пациентов и их близких



VRE

Ванкомицин-резистентные
энтерококки



VRE

Ванкомицин-резистентные энтерококки

Что означает VRE?

В кишечнике человека находятся многочисленные бактерии, относящиеся к нормальной кишечной флоре, в том числе и энтерококки. VRE – это те энтерококки, которые развили устойчивость (резистентность) к антибиотику ванкомицин.

Когда VRE становится опасным?

Для здорового человека **за пределами больничного учреждения** VRE, как правило, не представляет опасности. **В стационаре** же риск развития заражения и заболевания значительно повышается.

Опасность возникает при проникновении VRE из кишечника в кровь или другие части тела и вызывании ими инфекционного заболевания. Такие заболевания трудно поддаются лечению, поскольку многие антибиотики оказываются неэффективными.

Когда необходимо лечение?

При инфекции VRE с развитием симптомов инфекционного заболевания Ваш врач проведет специальное лечение одним из немногих, еще действующих антибиотиков.

При обнаружении VRE и отсутствии симптомов заболевания лечение не показано.

К чему Вы должны быть готовы:

В стационаре

- При обнаружении у Вас VRE Вы будете изолированы, поэтому покидать палату Вы сможете только по разрешению больничного персонала.
- Посетители должны придерживаться особых правил гигиены, которые будут им разъяснены персоналом.
- Для избежания дальнейшей передачи инфекции персонал больницы использует специальную защитную одежду (халаты, маски, перчатки и шапочки).
- **Особенно важна дезинфекция рук! Все (пациенты, посетители и персонал больницы) обязаны при выходе из палаты дезинфицировать руки** (см. рисунок)

За пределами больницы

- За пределами больничного учреждения риск заражения очень низок. Вы можете вести нормальный образ жизни.
- Часто мойте руки и соблюдайте правила личной гигиены.
- Проинформируйте продолжающих лечение врачей и специалистов по уходу о том, что у Вас был обнаружен VRE.
- Избегайте телесного контакта с людьми, у которых имеются открытые раны, а также с онкологическими больными.

Как передается VRE?

Высокая концентрация бактерий VRE обнаруживается в стуле и в определённых случаях в моче заболевших, иногда они могут находиться на поверхности открытых ран. В низкой концентрации VRE встречается в непосредственном окружении больного .

Оттуда VRE переносится, в основном через руки, на других людей.

Поставленная цель и пути её достижения.

Важнейшая цель - предотвращение распространения VRE.

Самым главным и простым способом ее достижения является правильная дезинфекция рук.